DR·SKIN
MEDYCZNE ORŁOWO

ZALECENIA PO ZABIEGU

Relfydess™

relabotulinumtoksyna A — płynna toksyna botulinowa

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zaleceniami i stosowanie się do nich — mają one istotny wpływ na bezpieczeństwo, komfort gojenia i ostateczny efekt zabiegu. Zalecenia mają charakter ogólny; indywidualne wskazówki przekaże lekarz lub osoba wykonująca zabieg.

Przez minimum 4 godziny

- nie pochylaj głowy do przodu i nie kładź się,
- nie uciskaj, nie masuj i nie pocieraj miejsc wkłuć,
- nie wykonuj intensywnego wysiłku fizycznego.

W dniu zabiegu

- nie pij alkoholu i nie pal papierosów,
- nie korzystaj z sauny, solarium ani basenu,
- unikaj wysokiej temperatury i opalania.

W kolejnych dniach

- przez 7 dni unikaj masaży twarzy i zabiegów kosmetycznych w obszarze iniekcji,
- przy siniakach stosuj chłodne okłady przez gazik,
- pełny efekt oceniamy po ok. 2 tygodniach — to dobry moment na wizytę kontrolną.

KIEDY PILNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM

- opadanie powieki lub brwi
- zaburzenia widzenia
- trudności w połykaniu, mówieniu lub oddychaniu
- uogólnione osłabienie mięśni
- silny ból lub nasilony obrzęk
- wysypka, pokrzywka, obrzęk twarzy

W razie wystąpienia powyższych objawów zadzwoń: **789 315 008**

Dr Skin Medyczne Orłowo Sp. z o.o. · al. Zwycięstwa 220, 81-521 Gdynia · tel. 789 315 008 · kontakt@drskin.pl · drskin.pl